
FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

Fascículo 61. SAMBUCACEAE





INSTITUTO DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Instituto de Biología

DirectoraTila María Pérez Ortiz

Secretario Académico Fernando A. Cervantes Reza

Secretaria Técnica Noemí Chávez Castañeda

COMITÉ EDITORIAL

Editora Rosalinda Medina Lemos

Editores Asociados J. Gabriel Sánchez Ken Abisaí García Mendoza Salvador Arias Montes

Cualquier asunto relacionado con esta publicación, favor de dirigirse a la Editora: Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. Apartado postal 70-233, C.P. 04510 México, D. F. Correo electrónico: editortehuacan@ibiologia.unam.mx

FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

Fascículo 61. **SAMBUCACEAE José Ángel Villarreal-Quintanilla***

*Departamento de Botánica Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





INSTITUTO DE BIOLOGÍA


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Primera edición: octubre de 2008 D.R. © Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Biología. Departamento de Botánica

ISBN 968-36-3108-8 Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán ISBN 970-32-5090-5 Fascículo 61

Dirección del autor:

Departamento de Botánica Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Buenavista, Saltillo C.P. 25315 Coahuila, México



En la portada:

- 1. Mitrocereus fulviceps (cardón)
- 2. Beaucarnea purpusii (soyate)
- 3. Agave peacockii (maguey fibroso)
- 4. *Agave stricta* (gallinita) Dibujo de Elvia Esparza

SAMBUCACEAE Batsch ex Borckh. José Ángel Villarreal-Quintanilla

Bibliografía. Backlund, A.A. 1996. *Phylogeny of Dipsacales*. PhD. Tesis, Arsskr: Uppsala University. Cronquist, A. 1981. *An integrated system classification of flowering plants*. New York: Columbia University Press. pp. 1002-1010. Judd, W.S., C.S. Campbell., E.A. Kellog, P.F. Stevens & M.J. Donoghue. 2002. *Plant Systematics, a phylogenetic approach*. Sunderland: Sinauer Associates. pp. 473-176. Villarreal Quintanilla, J.A. 2000. Sambucaceae. *In*: J. Rzedowski & G.C. de Rzedowski (eds.). *Flora del Bajío y Regiones Adyacentes*. 85: 1-5. Villarreal Quintanilla, J.A. 2003. Sambucaceae. *In*: A. Gómez Pompa & V. Sosa (eds.). *Flora de Veracruz* 129: 1-8.

Árboles o arbustos, deciduos o perennifolios, rara vez hierbas. Tallos erectos, corteza con lenticelas evidentes. Hojas opuestas, rara vez verticiladas, compuestas, pecioladas, estípuladas o exestipuladas, folíolos aserrados, usualmente inequiláteros. Inflorescencias terminales cimosas, en corimbos o panículas densas, pedunculadas y bracteadas. Flores actinomorfas, generalmente bisexuales, (4-)5-meras, sésiles o pediceladas, frecuentemente aromáticas; cáliz gamosépalo, 5-lobulado, lóbulos diminutos, persistentes en el fruto; corola gamopétala, blanca a amarillenta, rara vez púrpura, rotada, tubo corto (3-)5-lobulado, lóbulos ovales a lanceolados, ligeramente mayores que el tubo; estambres 5, epipétalos, exertos, filamentos insertos en la base de la corola, anteras amarillas a púrpuras, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal; gineceo sincárpico, 3-5-carpelar, 3-5-locular, ovario ínfero, óvulo 1 por lóculo, estilo corto, estigma lobulado. Frutos abayados, globosos a ovoides, de diverso color; semillas 3-5, testa membranácea, endospermo abundante.

Discusión. Cronquist 1981, ubica al género *Sambucus* como parte de la familia Caprifoliaceae, mencionando que la relación de *Sambucus* con los otros géneros de caprifoliáceas no son claras. En filogenias recientes al género *Sambucus* se le agrupa dentro de la familia Adoxaceae (Backlund, 1996). En este trabajo se trata como una familia independiente.

Diversidad. Familia monotípica.

Distribución. Regiones templadas y áreas montañosas de subtrópicos y trópicos del mundo.

SAMBUCUS L.

1. *SAMBUCUS* L., Sp. Pl. 1: 269. 1753.

Las mismas características descritas en la familia.

Bibliografía. Bolli, R. 1994. Revision of the genus *Sambucus*. Diss. Bot. 223: 1-227.

Discusión. En las filogenias recientes el género *Sambucus* se relaciona directamente al género *Adoxa*, ambos tienen como grupo hermano a *Viburnum*. La monofilia de la familia Adoxaceae, esta respaldada tanto por caracteres morfológicos como moleculares; las hojas compuestas, las perforaciones de vaso simples, las anteras extrorsas y el desarrollo del megagametofito tipo *Adoxa*, los hace ser parte de este grupo. La sinapomorfia que separa a *Sambucus* de *Adoxa* es la pequeña abertura apical del endocarpo (Judd *et al.* 2002).

Diversidad. En la revisión taxonómica del género se reconocen 9 especies y varios taxa infraespecíficos, algunas tienen uso medicinal y ornamental. Se registra 1 especie con 2 subespecies en México, 1 en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. Regiones templadas y subtropicales, la mayor parte de las especies en el Hemisferio Norte, con algunos representantes en Sudamérica, África y Australia.

Sambucus nigra L. Sp. Pl. 1: 269. 1753. TIPO: ALEMANIA. Sin localidad, S.C. s.n.,s.f. (holotipo: LINN; microficha: IDC-0381/A3 IBUNAM!).

Arbustos o árboles, 2.0-6.0 m alto. Rizomatosos. Tallos con corteza fisurada, lenticelas redondeadas o elípticas; ramas glabras a hirsútulas. Hojas ocasionalmente bipinnadas, exestipuladas, pecíolos 2.0-5.0 cm largo, generalmente hirsútulos; folíolos (3-)5-9(-11), 0.4-1.2 cm largo, 2.0-5.0 cm ancho, ovados, obovados, elípticos a lanceolados, base redondeada a cuneada, frecuentemente inequilátera, ápice acuminado, herbáceas, concoloros, margen aserrado, haz glabra, envés glabro a hirsútulo. Inflorescencias en panículas corimbosas, 4.0-10.0 cm largo, 7.0-15.0 cm diámetro; pedúnculos 2.0-5.0 cm largo, radios primarios 5-6, 2.0-4.0 cm largo, radios secundarios 4-6, 1.0-1.8 cm largo; pedicelos 1.0-5.0 mm largo, glabros a frecuentemente hirsútulos, ebracteados. Flores 0.5-0.8 mm largo, lóbulos deltoideos, glabros; corola 4.0-8.0 mm diámetro, glabra, tubo 1.5-2.5 mm largo, lóbulos 2.0-3.0 mm largo, oblongos; estambres 1.0-1.5 mm largo, glabros, anteras ca. 1.0 mm largo; ovario ca. 1.0 mm diámetro, semiesferoidal, glabro. Frutos abayados, 4.0-5.0 mm diámetro, esferoidales, púrpuras o negros, glabros; semillas 2.0-4.0 mm largo, ovadas, rugosas, negras.

Discusión. Especie con mucha variación en el hábito de crecimiento, en las hojas y el color de la flor, lo que hace que la delimitación infraespecífica sea complicada. Bolli (1994), reconoce 6 subespecies, de las cuales una esta presente en el área del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. América, desde Canadá, Estados Unidos y México hasta Centroamérica, incluyendo las Antillas.

Sambucus nigra L. subsp. canadensis (L.) Bolli, Diss. Bot. 223: 168. 1994. Sambucus canadensis L., Sp. Pl. 1: 269. 1753. TIPO: CANADA. Sin localidad, S.C. s.n., s.f. (lectotipo: LINN, designado por Britton & Brown, 1913; microficha: IDC-0381/A2 IBUNAM!).

Sambucus bipinnata Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 171. 1830. TIPO: MÉXICO. Veracruz: Jalapa, *C.J.W. Schiede* y *F.Deppe 273*, s.f. (holotipo: NY, microficha: MP-IDC-1017/B08 IBUNAM!).

Sambucus mexicana C.Presl ex DC., Prodr. 4: 322. 1830. Sambucus mexicana C.Presl ex DC. var. bipinnata (Schltdl. & Cham.) Schwer., Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 1909. (18): 34, 328. 1909. TIPO: MÉXICO. Sin localidad, *T.P.X. Haenke s.n.*, s.f. (holotipo: PR; isotipo: MO, http://www.tropicos.org/!).

Arbustos con lenticelas redondeadas; hojas 5-7(-9) folioladas, a veces bipinnadas; folíolos lanceolados, margen aserrado y ovario 3-5-loculado.

Distribución. Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica incluyendo las Antillas. En México se encuentra en el Distrito Federal y los estados de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Ejemplares examinados. OAXACA: Dto. Etla: entre El Parián y Huauclilla, *Altamirano s.n.* (MEXU). Dto. Teotitlán: San Bernardino, *Conzatti 2109* (MEXU). Dto. Teposcolula: Río Teposcoula, 500 m sur del poblado, *García-Mendoza 531* (MEXU); base del cerro de Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, a la orilla del río, km 11 de la carretera Yucundaá-Teposcolula, *8660* (MEXU).

Hábitat. Bosque de *Pinus-Quercus*, vegetación riparia y secundaria. En elevaciones de 2000-2400 m.

Fenología. Floración y fructificación casi todo el año.






Fig. 1. Sambucus canadensis subsp. nigra. -a. Rama con hojas, inflorescencia e infrutescencia. -b. Flor. -c. Fruto. Ilustrado por M.A.Carranza Pérez, reproducida de Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes 85: 3. 2000, con autorización de los editores.





OAXACA

DISTRITO	MUNICIPIO	No.
I Coixtlahuaca	Concepción Buenavista San Cristóbal Suchixtlahuaca San Francisco Teopan San Juan Bautista Coixtlahuaca San Mateo Tlapiltepec San Miguel Tequixtepec San Miguel Tulancingo Santa Magdalena Jicotlán Santa María Nativitas Santiago Ihuitlán Plumas Santiago Tepetlapa Tepelmeme Villa de Morelos Tlacotepec Plumas	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
II Cuicatlán	Concepción Pápalo San Juan Bautista Cuicatlán San Juan Tepeuxila San Pedro Jaltepetongo San Pedro Jocotipac Santa María Texcatitlán Santiago Nacaltepec Santos Reyes Pápalo Valerio Trujano	14 15 16 17 18 19 20 21 22
III Etla	San Francisco Telixtlahuaca San Jerónimo Sosola San Juan Bautista Atatlahuaca Santiago Tenango	23 24 25 26
IV Huajuapam	Asunción Cuyotepeji Cosoltepec Ciudad de Huajuapam de Léon San Andrés Dinicuiti San Juan Bautista Suchitepec San Pedro y San Pablo Tequixtepec Santa Catarina Zapoquila Santa María Camotlán Santiago Chazumba Santiago Huajolotitlán Santiago Miltepec Zapotitlán Palmas	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

J.A. VILLARREAL-QUINTA	SAMBUCACEAE		
DISTRITO		MUNICIPIO	No.
V Nochixtlán	Acuno	ión Nochixtlán	39
V Nociliztian		ndrés Sinaxtla	40
		uan Yucuita	41
		iguel Chicaua	42
		iguel Huautla	43
		edro Coxcaltepec Cántaros	44
	Santa	45	
	Santa	46	
	Santia	47	
	Santia	48	
		Domingo Yanhuitlán	49
VI Teotitlán	Mazat	lán Villa de Flores	50
vi reoman	San A	51	
	San Ji	52	
	San M	53	
	Santa	54	
		María Tecomavaca	55
		án de Flores Magón	56
		arr de 1101es Magerr	
VII Teposcolula	La Tri	57	
	San A	58	
	San B	59	
	San Jı	60	
	San Pe	61	
	Santo	62	
	Teotor	63	
	Villa d	64	
	villa i	ejupam de la Unión	65
PUEBLA			
MUNICIPIO	No.	MUNICIPIO	No.
Ajalpan	1	San Gabriel Chilac	17
Altepexi	2	San José Miahuatlán	18
Atexcal	3	San Miguel Ixitlán	19
Cañada Morelos	4	Santiago Miahuatlán	20
Caltepec	5	Tecamachalco	21
Chapulco	6	Tehuacán	22
Chila	7	Tepanco de López	23
Coxcatlán	8	Tlacotepec de Benito Juárez	24
Coyomeapan	9	Totoltepec de Guerrero	25
Coyotepec	10	Vicente Guerrero	26
Esperanza	11	Xochitlán Todos Santos	27
Ixcaquixtla	12	Yehualtepec	28
Juan N. Méndez	13	Zapotitlán	29
Nicolás Bravo	14	Zinacatepec	30
Palmar de Bravo	15	Zoquitlán	31
San Antonio Cañada	16		

Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Fascículo 61. Sambucaceae, se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2008, en los talleres de S y G editores, Cuapinol 52, Col. Pedregal de Santo Domingo, 04369 México, D.F. arturosyg@cablevision.net.mx. Se tiraron 300 ejemplares sobre papel bond de 90 grs. y las cubiertas en cartulina reciclada concept de 220 grs., el cuidado de la edición estuvo a cargo de los editores.



FASCÍCULOS PUBLICADOS *

N	lo. Fasc.	N	lo. Fasc
Acanthaceae Thomas F. Daniel	23	Gymnospermae Rosalinda Medina L.	
Aizoaceae Rosalinda Medina L.	46	y Patricia Dávila A.	12
Annonaceae Lawrence M. Kelly	31	Hernandiaceae Rosalinda Medina L.	25
Apocynaceae Leonardo O. Alvarado-	Hyacinthaceae Luis Hernández	15	
Cárdenas	38	Julianiaceae Rosalinda Medina L.	30
Araliaceae Rosalinda Medina L.	4	Krameriaceae Rosalinda Medina L.	49
Arecaceae Hermilo J. Quero	7	Lennoaceae Leonardo O. Alvarado-	
Aristolochiaceae Lawrence M. Kelly 2		Cárdenas	50
Asclepiadaceae Verónica Juárez-Jaime	s	Lentibulariaceae Sergio Zamudio-Ruiz	45
y Lucio Lozada	37	Linaceae Jerzy Rzedowski y Graciela	
Basellaceae Rosalinda Medina L.	35	Calderón de Rzedowski	5
Betulaceae Salvador Acosta-Castellano	s 54	Loganiaceae Leonardo O. Alvarado-	
Buddlejaceae Gilberto Ocampo-Acosta	39	Cárdenas	52
Cactaceae Salvador Arias Montes,	Malvaceae Paul A. Fryxell	1	
Susana Gama López y Leonardo		Melanthiaceae Dawn Frame, Adolfo	
Ulises Guzmán Cruz	14	Espejo y Ana Rosa López-Ferrari	47
Calochortaceae Abisaí García-Mendoza	ı 26	Melastomataceae Carol A. Todzia	8
Capparaceae Mark F. Newman	51	Meliaceae Ma. Teresa Germán-Ramírez	42
Caprifoliaceae Jose Ángel Villarreal-		Mimosaceae Tribu Acacieae	
Quintanilla	58	Lourdes Rico Arce y Amparo	
Caricaceae J.A. Lomelí-Sención	21	Rodríguez	20
Cistaceae Graciela Calderón de		Mimosaceae Tribu Mimoseae	
Rzedowski y Jerzy Rzedowski	6	Rosaura Grether, Angélica	
Cleomaceae Mark F. Newman	53	Martínez-Bernal, Melissa Luckow y	
Convallariaceae Jorge Sánchez-Ken	19	Sergio Zárate	44
Cucurbitaceae Rafael Lira e Isela		Molluginaceae Rosalinda Medina L.	36
Rodríguez Arévalo	22	Passifloraceae Leonardo O.	
Cytinaceae Leonardo O.		Alvarado-Cárdenas	48
Alvarado-Cárdenas	56	Plocospermataceae Leonardo O.	
Dioscoreaceae Oswaldo Téllez V.	9	Alvarado-Cárdenas	41
Ebenaceae Lawrence M. Kelly	34	Poaceae subfamilias Arundinoideae,	
Elaeocarpaceae Rosalinda Medina L.	16	Bambusoideae, Centothecoideae	
Erythroxylaceae Lawrence M. Kelly	33	Patricia Dávila A. y Jorge Sánchez-Ker	n 3
Fabaceae Tribu Crotalarieae Carmen		Pteridophyta Ramón Riba y Rafael Lira	ı 10
Soto-Estrada	40	Sapotaceae Mark F. Newman	57
Fabaceae Tribu Desmodieae Leticia		Setchellanthaceae Mark F. Newman	55
Torres-Colín y Alfonso Delgado-Salina	s 59	Simaroubaceae Rosalinda Medina L. y	
Fabaceae Tribu Psoraleeae Rosalinda		Fernando Chiang C.	32
Medina L.	13	Smilacaceae Oswaldo Téllez V.	11
Fabaceae Tribu Sophoreae Oswaldo		Theophrastaceae Oswaldo Téllez V.	
Téllez V. y Mario Sousa S.	2	y Patricia Dávila A.	17
Fagaceae M. Lucía Vázquez-Villagrán	28	Thymelaeaceae Oswaldo Téllez V.	
Fouquieriaceae Exequiel Ezcurra y		y Patricia Dávila A.	24
Rosalinda Medina L.	18	Turneraceae Leonardo O.	
Gentianaceae José Ángel Villarreal-		Alvarado-Cárdenas	43
Quintanilla	60	Verbenaceae Dominica Willmann,	
		Eva-María Schmidt, Michael	
* Por orden alfabético de familia		Heinrich y Horst Rimpler	27

